DLP 8-11-84447074

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Circonscription
PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGO -
☎ (95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 43
du 26 Octobre 1984.

- *Invasion des **Cicadelles vertes** des **Agrumes**.*
- *2eme traitement contre les **Processionnaires** du pin.*
- *COLZA : attention aux **limaces** et aux **altises**.*

CICADELLES VERTES DES AGRUMES

Elles sont très nombreuses dans les vergers. Un traitement généralisé doit être rapidement effectué. Les matières actives suivantes peuvent être utilisées :

Méthidathion	ULTRACIDE
Parathion	*Nombreuses spécialités*
Formothion	ANTHIOFORT
Dimethoate	*Nombreuses spécialités*
Méthomyl	LANNATE
Deltamétrine	DECIS
Cyperméthrine	*Nombreuses spécialités*

PROCESSIONNAIRES DU PIN

Dans les zones où les nids d'hiver furent nombreux en I983, effectuez un 2eme traitement 15 jours à 3 semaines après le Ier.

C O L Z A

Suivant les dates de semis et les variétés, les stades de développement sont très différents. Certaines variétés sont au stade - 6 feuilles vraies -(Jet Neuf), d'autres sont plus tardives (Lingot, Bienvenu). Certains Colzas viennent même d'être semés.

*** ATTENTION aux limaces**

Elles peuvent être responsables de dégâts importants. Surveillez les colzas dès la levée. Epandre quelques poignées de granulés anti-limaces sous une tuile et noter la quantité de limaces mortes.



Si elles sont nombreuses, épandez régulièrement des appâts sous forme de granulés à base de :

P27

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur-Gérant: P.DUFFAUD
Abonnement Annuel : 72 F. 3
Régisseur de Recettes D.D.A.
CCP MARSEILLE 9660 74 V
Publication Périodique
CPPAP N°1769 A-D

- *Métaldehyde à 5 % : 15 à 30 Kg/ha.*
- *Mercaptodiméthur à 4 % : MESUROL anti-limaces, à raison de 3 Kg/ha.*

Effectuez le traitement le soir.

**** ATTENTION aux ALTISES***

Le COLZA est sensible de la levée au stade - 2 feuilles vraies -. Vérifiez la présence d'Altises en utilisant des cuvettes pièges jaunes enterrées au ras du sol (1 à 2 par percelle). Intervenez dès que 3 plantes sur 10 présentent des morsures, avec :

GROSSE ALTISE ADULTE



Cyperméthrine	*RIPCORD*	*0,4*	*1/ ha*
	CYMBUSH	*0,25*	*1/ ha*
	KAFIL super	*0,25*	*1/ ha*
	MASTOR	*0,4*	*1/ ha*
Deltaméthrine	*DECIS*	*0,3*	*1/ ha*
Fenvalérate	*SUMICIDIN 10*	*0,5*	*1/ ha*

-=-=-=-=-=-=-=-=-